

## SARS與一般感冒徵兆、症狀比較表

徵兆	流行性感冒 (Flu)	普通感冒 (Cold)	嚴重急性呼吸道症候群(SARS)
症狀的開始	症狀突然發生且在數小時之內惡化。	症狀逐漸發生，從鼻塞開始	發燒 (高於38度)
喉嚨痛	偶有明顯的喉嚨痛	喉嚨沙沙的，較不嚴重	程度不明的喉嚨痛
發燒	高溫 (體溫高於38度)	較少見發燒，如果有的話，溫度也只有些微的升高	高溫2天以上 (體溫高於38度)
頭痛	通常伴隨嚴重的頭痛。	偶爾會有輕微的頭痛。	程度不明的頭痛。
酸痛	會造成全身性的關節疼痛，會有明顯且持續的疲勞與虛弱	較輕微或少見。	頸痛、肌肉僵直或酸痛。
咳嗽與噴嚏	症狀開始之後的頭一、二天之內通常會咳嗽，打噴嚏則較不常見	通常會有打噴嚏與鼻塞	乾咳
病程	疾病期為1～2週，常有胸腔不適感。	短期間可復原	最好的治療方式尚未明朗。死亡率約3%
併發症	嚴重的，如肺炎、鼻竇炎、支氣管炎及兒童的中耳炎，也可能造成心冗炎與腦炎	較輕微的	食慾不佳、神智不清、呼吸困難皮膚疹或下痢、肺部病變等
潛伏期	感染病毒的1-3天發作		2—7天，最長10天。